




C.H.U.N.	CREBHN	ARCHET 2	Page 1/...	
Chirurgie d'un patient avec épidermolyse bulleuse héréditaire				
Protocole de soins				
Mots clés :				
Epidermolyse bulleuse héréditaire, chirurgie				
Rédaction	Mise à jour	Vérification	Approbation	
C.Chiaverini 39398	C.Chiaverini 39398	[nom, n° poste]	[nom, n° poste]	
Date de création :	Date de dernière mise à jour :	Date de vérification :	Date d'approbation :	
17/01/2012	26/06/2012	[date format jj/mm/aa]	[date format jj/mm/aa]	
Signature	Signature	Signature	Signature	
Diffusion				
Date :	Emetteur :	Type :	Mode :	Cible :
17/01/2012		<input checked="" type="checkbox"/> restreint <input type="checkbox"/> général	<input checked="" type="checkbox"/> papier <input type="checkbox"/> email <input checked="" type="checkbox"/> site intranet	<input type="checkbox"/> direction générale <input type="checkbox"/> directions fonctionnelles <input checked="" type="checkbox"/> services cliniques <input type="checkbox"/> services médico-techniques <input type="checkbox"/> tous services <input type="checkbox"/> tous personnels
Application		Validité		
Immédiate		permanente		

	CREBHN	ARCHET 2		Page x/y
	Protocole de soins d'adulte EBH en hospitalisation	[INDEXATION]		
		Création	MàJ	Vérification
		17/01/2012]	[Date MàJ]	[Date Vérification]
	Approbation	Diffusion	Application	
Protocole de soins	Elaboration : C.Chiaverini	[Date approbation]	[Date diffusion]	[Date application]
		Validité :		

Il s'agit tout d'abord d'un PATIENT comme un autre qui doit avoir les mêmes soins que les autres mais adaptés à sa peau. Ces patients n'ont pas de déficit immunitaire, il est donc inutile d'adopter des mesures d'hygiène excessives.

Ces patients ont la peau (et les muqueuses) fragile, il ne faut ni coller d'adhésif sur la peau (pansement, électrode, sparadrap...) ni mettre de matériel potentiellement traumatisant (bracelet d'identification, etc...), ni froter (brassard tension).

COMMENT MANIPULER LE PATIENT ?

Il est important de ne jamais tirer le patient sous les bras. En cas de besoin il faut le porter à deux, un mettant les bras sous le dos et l'autre sous les jambes. Utiliser un drap pour transférer de lit est très utile pour éviter les manipulations.

Attention aux objets (montres, colliers, bagues, stylos dans la poche) que vous portez et qui peuvent être traumatisants.

De même utiliser un lit avec matelas anti-escarre.

CONSULTATION D'ANESTHESIE

Faire préciser par le médecin responsable: la forme d'épidermolyse bulleuse et ses complications spécifiques (atteinte buccale, laryngo-trachéale, oesophagienne...), les traitements en cours, l'existence de complications cardiaques ou rénales ; Utiliser le carnet EB du patient si disponible.

Evaluer la microstomie, les brides linguales, la fragilité dentaire

Prise de la tension artérielle à travers le vêtement, sans multiplier les prises

Pour le bilan préopératoire, dans la mesure du possible, se contenter des bilans déjà réalisés, éviter tout prélèvement inutile. Si besoin: double détermination du groupe sanguin, NFS plaquettes, bilan électrolytique et albuminémie (anémie carencielle et hypoalbuminémie sous-jacentes sont très fréquentes).

Demander au patient d'apporter au cas échéant ses pansements pour le bloc, si non disponibles à l'hôpital+++


QUELLES PRECAUTIONS AU BLOC OPERATOIRE ?

Toute l'équipe doit être attentive et bien informée pour prendre en charge ces patients sensibles aux regards et aux remarques. Tous les gestes (installation, déshabillage, mobilisation, contention) doivent être effectués avec douceur.

Pose de voie veineuse et perfusion

En cas d'utilisation de crème anesthésiante avant la pose de la perfusion faire tenir le produit avec un film plastique alimentaire scotché sur lui même.

Désinfection de la peau avec de la BISEPTINE®

 <p>Epidermolyses Bulleuses Héritaires Centre de Référence Maladies Rares CHU de Nice</p>	CREBHN	ARCHET 2		Page x/y
	Protocole de soins d'adulte EBH en hospitalisation	[INDEXATION]		
		Création 17/01/2012]	MàJ [Date MàJ]	Vérification [Date Vérification]
		Approbation	Diffusion	Application
Protocole de soins	Elaboration : C.Chiaverini	[Date approbation]	[Date diffusion]	[Date application]
Validité :				

Mettre le garrot sur un vêtement (pas de contact direct avec la peau) et le moins serré possible
 Ne pas mettre de pansement adhésif sur la peau, mais un MEPILEX® + bande pour maintenir le cathlon
 Mettre un MEPILEX® en guise de pansement après une ponction veineuse, tenu par un TUBIFAST®.

Installation et monitoring :

Vérifier que la table de bloc soit anti-escarre, sinon mettre des blocs de gelose recouvert d'un drap doux ou plusieurs épaisseurs de couvertures pour ne pas induire de bulle de pression.

Attention aux couvertures chauffantes : pas trop chaud !!

Ne pas utiliser de champs opératoires collants+++++

Ne pas mettre le brassard directement sur la peau : protéger la peau sous le brassard de tension artérielle par petite bande ou par un pansement interface de type Mepilex®. Ne pas laisser le brassard sur le bras trop longtemps.

Découper au maximum les électrodes et les faire tenir avec un bandage ou un TUBIFAST®. Pour le saturomètre ; entourer la sonde de MEPILEX® et faire un petit trou au niveau du capteur. Faire tenir par un MEPILEX®.

Ne pas mettre de collants pour fermer les yeux, bien hydrater avec collyre/pommade ophtalmologique adapté très régulièrement. Au besoin utiliser des bandelettes de MEPILEX®.

Intubation :

Peut être difficile (ouverture buccale limitée, lésions de la langue hémorragiques)

Fixation particulière : passer une bande auto-adhésive autour de la tête pour permettre de fixer normalement la sonde sur la bande avec un sparadrap (les autres prothèses nécessaires pourront être fixées de la même manière sur la bande). L'autre possibilité est de mettre des pansements de type MEPILEX EM® sur la joue pour coller dessus les pansements.

Chaque fois que possible l'intubation doit être évitée.

Oxygénation

Eviter autant que possible les sondes nasales, privilégier les lunettes à oxygène en évitant de les serrer et protéger la peau de la tubulure par un MEPILEX EM ®. En cas d'utilisation d'un masque protéger la peau par du MEPILEX® pour éviter les bulles sur les points d'appuis (même en cas de masque avec une bordure gonflable).

Remarque

Il existe des sprays siliconés qui peuvent aider à décoller des adhésifs qui auraient été malencontreusement utilisés. Dans tous les cas ne pas tirer pour enlever, laisser tremper dans l'eau ou utiliser des produits adaptés.

En cas de doute, s'abstenir et nous contacter :

Dr CHIAVERINI, IDE : C.LAGUENY : 04-92-03-93-98